

استاداری فارس

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی



جمهوری اسلامی ایران


وزارت کشور

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - ۰۹:۲۳:۳۲

شماره: ۵۶/۲۲/۲۳۴۴۵/۱۴۰۱

پوست: دارد

نوعیت: عادی



بسمه تعالی

سال تولد دانش بنیان، اشغال آفرین

فرمانداران محترم شهرستانهای فارس

مدیران و روسای محترم دستگاههای اجرایی استان فارس

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۵۵ / ۲۷ / ۲۱ / ۱۴۰۱ تاریخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۲۳ مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان فارس در خصوص واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری هپاتیت B برای آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال می شود.

با تشکر

سید حسین حقایقی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

رونوشت:

- جناب آقای دکتر محبی پور معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای استحضار
- جناب آقای قربانی مدیر کل محترم امور مالی و اداری برای استحضار و دستور اقدام لازم
- جناب آقای درویش مدیر عامل محترم هلال احمر استان برای همکاری لازم

اسوا علاج

ملواتی

۱۹۱

اتاق اصناف مرکز استان فارس
« اتوماسیون اداری »
شماره: ۱۱۰ / ۳ / ۳۴۴۸
تاریخ: ۱۴۰۱ / ۵ / ۱

نویس



جناب آقای اسماعیل محبی پور

معاون محترم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس

موضوع: در خصوص پیشگیری از بیماری هپاتیت B

با سلام و احترام

به استحضار می رساند بیماری هپاتیت B، یک بیماری ویروسی می باشد که از طریق بزاق دهان، ترشحات، خون، سرنگ های آلوده و ارتباط جنسی با فرد آلوده قابل انتقال می باشد. هپاتیت B یک بیماری جدی و خطرناک است که در کوتاه مدت ایجاد بی اشتهایی، خستگی، درد عضلانی، درد و تورم شکم و در درازمدت باعث آسیب به کبد، سیروز کبدی -سرطان کبد و نهایتا مرگ می شود.


نکته حائز اهمیت اینکه بیش از نیمی از افراد مبتلا به هپاتیت B فاقد علائم بالینی می باشند اما ناقل بیماری هپاتیت B هستند. قدرت سرایت این بیماری بیش از ۱۰۰ برابر ویروس HIV می باشد. ویروس HIV حداکثر یک ساعت بیرون از بدن زنده می ماند اما ویروس هپاتیت B قادر است ۷ تا ۱۰ روز خارج از بدن زنده بماند و قابلیت بیماری زایی دارد، از این رو کلیه گروه های در معرض خطر الزامیست که واکسن هپاتیت B را تزریق نمایند.

*خوشبختانه واکسیناسیون هپاتیت B تا ۹۰٪ در برابر این مصونیت ایجاد می کند و نقش بسزایی در پیشگیری از این بیماری دارد (واکسیناسیون کامل در ۳ مرحله - در مدت ۶ماه تزریق می گردد و هزینه تزریق هر دوز ۲۵۰/۰۰۰ ریال می باشد).
لذا توصیه می شود گروه های پرخطر از قبیل:

- ۱- کارکنان مراکز درمانی، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها، دندانپزشکی ها، مراکز تشخیصی و رادیولوژی بخش های دولتی و خصوصی
- ۲- کارکنان شهرداری و آتش نشانی
- ۳- کارکنان مراکز تحت اداره بهداشتی
- ۴- قوه قضائیه، زندان ها، پزشکی قانونی
- ۵- کارکنان بانک های دولتی و خصوصی
- ۶- اصناف و آرایشگران
- ۷- پرسنل نیروی انتظامی و ...

واکسیناسیون هپاتیت B را بطور کامل انجام دهند، به همین جهت درمانگاه هلال احمر آمادگی خود را جهت انجام واکسیناسیون هپاتیت B حتی در مراکز اداری، شرکت ها و مراکز درمانی اعلام می دارد. ضمنا آقای علی هوشمندی با شماره تلفن ۰۹۲۷۲۷۶۰۴۶۲ جهت هماهنگی معرفی می گردد. لذا خواهشمند است جهت پیشگیری از بیماری فوق دستور فرمائید اقدام لازم از طریق ادارات مربوطه صورت گیرد.

(به پیوست یک برگ پمفلت آموزشی جهت اطلاع رسانی به گرو های پرخطر ارسال می گردد)



تشخیص:

تشخیص هیاتیت حاد B از طریق آزمایش خون انجام می
واکسن هیاتیت B:

واکسن های هیاتیت B کاملا بدون خطر بوده و در بیشتر
90٪ موارد موثر می باشد.

**هدف از انجام واکسیناسیون پیشگیری از ایجاد عفونت ه
هیاتیت B و در نتیجه جلوگیری از عوارض عفونت مزمن
التهاب کبد و سرطان سلول های کبد است.**

با واکسیناسیون برنامه ریزی شده و هدفمند می توانوا
حدود زیادی شیوع هیاتیت B را در جامعه کاهش داد .
بطور کلی 85 تا 90٪ مرگ های ناشی از ویروس هیاتیت
واکسن قابل پیشگیری می باشد.

چه افرادی باید واکسن هیاتیت B را تزریق کنند؟

- 1- نوزادان مطابق برنامه ایمن سازی کشوری
- 2- کارکنان بخش مراقبت های درمانی و ایمنی عمومی ک
معرض خون یا مایعات بدن هستند. (پزشکان ، پرست
ماماها ، بهاران ، کمک بهاران ، واکسیناتورها ، دندانپ
، کمک دندانپزشکان ، کارشناسان و تکنیس
آزمایشگاههای تشخیص طبی، نقلاتچیان واحدهای بهد
درمانی و آزمایشگاههای تشخیص طبی و ...)

3

اغلب افرادی که دچار هیاتیت B مزمن می شوند،
علائمی ندارند اما این بیماری هنوز بسیار جدی است و
می تواند به این موارد منجر شود:

• آسیب کبدی (سیروز)

• سرطان کبد

افرادى که دچار آلودگی مزمن به این ویروس هستند،

حتی اگر احساس بیماری نکنند یا بیمار به نظر نرسند
می توانند ویروس هیاتیت B را منتشر کنند.

روش های انتقال :

1- انتقال از مادر به جنین (کودکی که مادرش آلوده است
ممکن است در هنگام تولد یا پس از آن آلوده شود)

2- استفاده اشتراکی از وسایلی مانند تیغ و مسواکی با
فرد آلوده

3- تماس با خون یا زخم باز فرد آلوده

4- رابطه جنسی با فرد آلوده

5- استفاده اشتراکی از سوزن، سرنگ یا سایر ابزارهای
تزریق مواد مخدر، خالکوبی و ...

6- قرار گرفتن در معرض خون ناشی از سر سوزن یا
سایر ابزارهای تیز

7- پیوند اعضا (در صورتیکه فرد اهدا دهنده آلوده باشد)
و ...

2

هیاتیت یک بیماری شایع است که بعلت التهاب کبد
ایجاد می شود. هیاتیت به 2 نوع حاد و مزمن
تقسیم می گردد و در اثر انواع ویروس ها ،الکل،
داروها و جایگزینی بافت چربی و ... درکند ایجاد
می شود.

هیاتیت های ویروسی که جزء علل مهم درگیری
کبد می باشند در اثر آلودگی با ویروس های
هیاتیت نوع C، B، A، D ایجاد می شود. یکی
از عوامل مهم هیاتیت های ویروسی ، هیاتیت B می
باشد. اهمیت هیاتیت B ، شیوع زیاد این بیماری و
همچنین عوارض مهم کبدی و خارج کبدی است.

حالت زوده گزر آلودگی به ویروس هیاتیت B ، یک
بیماری کوتاه مدت است که ظرف مدت 6 ماه پس از
اینکه فرد در معرض ویروس هیاتیت قرار می گیرد رخ
می دهد.

این بیماری می تواند منجر به موارد زیر شود:

- تب، خستگی، کم اشتها، تهوع و یا استفراغ .
- یرقان (زردی پوست یا چشم، ادرار تیره، مدفوع به
رنگ خاک رس.)
- احساس درد در عضلات، مفاصل و معده

حالت مزمن آلودگی به ویروس هیاتیت B ، یک بیماری
طولانی مدت است که وقتی رخ می دهد که ویروس
هیاتیت B ، در بدن فرد باقی می ماند.

1



جمعیت هلال احمر

معاونت بهداشت درمان و توانبخشی

هیپاتیت B

کد سالم

کد مبتلا به ویروس هیپاتیت B



تهیه کننده:

معاونت بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان فارس

عوارض جانبی :

عوارض معمولاً خفیف بوده و خود به خود از بین می روند، اما احتمال بروز واکنش های شدید نیز وجود دارد. مشکلات خفیف پس از تزریق واکسن هیپاتیت :

درد در محل تزریق

تب 37/7 درجه یا بیشتر

در صورتی که این مشکلات اتفاق بیفتد، معمولاً بلافاصله پس

از تزریق رخ می دهد و 1 یا 2 روز طول می کشد.

* نشانه های یک واکنش آلرژیک شدید می تواند شامل


کلهپور، ورم صورت و گلو، مشکلات تنفسی، تندی ضربان قلب،

گیجی یا ضعف باشد. این وضعیت از چند دقیقه تا چند ساعت

پس از واکسیناسیون شروع می شود.

در این صورت به نزدیکترین بیمارستان یا مرکز درمانی

مراجعه کنید .



* توصیه می شود آنتی بدلی ضد هپاتیت B، یک تا سه ماه پس از کامل شدن نوبتهای تریپل واکسن اندازه گیری شود.

3- افرادی که به علت ناتوانی و مشکل خاص پزشکی در

موسسات خاصی طولانی مدت بستری و نگاه داری می شوند.

4- بیماران مبتلا به بیماری های مزمن کبدی و افراد آلوده

به هیپاتیت C

5- بیماران همودیالیز.

6- دریافت کنندگان مکرر خون یا فرآورده های خونی.

7- مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی.

8- صاحبان رفتارهای جنسی پرخطر خصوصاً کسانی که

سابقه بیماری آمیزشی دارند.

9- زندانیان با سابقه رفتارهای پرخطر مدت اقامت بیش

از 6ماه.

10- رفتگران شهر داری، آتش نشان ها ، امدادگران

اورژانس، زندان بانان، کارشناسان آزمایشگاه های تحقیقات

جناحی و جرم.

11- افرادی که کاندید پیوند عضو هستند.

12- نوجوانان زیر 18 سال که قبلاً واکسینه نشده اند.

13- افرادی که شریک جنسی آنها مبتلا به هیپاتیت B است.

14- مسافران که به مناطقی سفر می کنند که شیوع

هیپاتیت B در آنجا زیاد است و ...

بعضی از افراد نباید این واکسن را دریافت کنند:

در صورتی که فرد دریافت کننده واکسن مبتلا به هر گونه

آلزای شدید و خطرناک می باشد.

در صورتی که پس از دریافت واکسن هیپاتیت B واکنش

آلرژیک خطرناک داشته آید یا اینکه نسبت به بخشی از این

واکسن آلرژی دارید. به شما توصیه میشود که واکسن را

دریافت نکنید .